


# **Sommerfortbildungs- programm 2017**

**der Universitätsklinik  
für Gynäkologie  
und Geburtshilfe  
Innsbruck**



# Mit Abraxane<sup>®</sup> länger leben



**beim metastasierten Mammakarzinom<sup>1,\*</sup>**  
medianes OS von 13,0 Monaten



**beim metastasierten Pankreaskarzinom<sup>2,\*\*</sup>**  
medianes OS von 8,7 Monaten



**beim nichtkleinzelligen Bronchialkarzinom (NSCLC)<sup>3,\*\*\*</sup>**  
medianes OS von 19,9 Monaten bei  $\geq 70$ -Jährigen

\* Das mediane Gesamtüberleben (OS) der MBC-Patientinnen mit  $\geq 1$  Vortherapie betrug für Abraxane<sup>®</sup> 13,0 Monate versus 10,7 Monate unter konventionellem Paclitaxel (HR = 0,73; p = 0,024).

\*\* Das mediane Gesamtüberleben (OS) der MPC-Patienten im first line setting betrug für Abraxane<sup>®</sup> in Kombination mit Gemcitabin 8,7 Monate versus 6,6 Monate unter Gemcitabin-Monotherapie (HR = 0,72; p < 0,001).

\*\*\* Bei Patienten mit nichtkleinzelligem Bronchialkarzinom (NSCLC)  $\geq 70$  Jahre betrug das OS 19,9 Monate unter der Therapie mit Abraxane<sup>®</sup> + Carboplatin vs. 10,4 Monate verglichen mit konventionellem Paclitaxel + Carboplatin (p = 0,009).

1. Gradishar et al., J Clin Oncol. 2005; 23:7794-7803

2. Goldstein D et al., J Natl Cancer Inst. 2015 Jan 31;107(2). pii: dju413. doi: 10.1093/jnci/dju413. Print 2015 Feb.

3. Socinski MA et al., Ann Oncol. 2013 Feb; 24(2):314-21

## Allgemeine Hinweise

**Zeit:** Samstag, 20. Mai 2017, 8.50 – 16.00 Uhr  
**Ort:** FeuerWerk – HolzErlebnisWelt  
Zillertalstraße 39 (bei Fa. Binderholz), 6263 Fügen  
[www.binder-feuerwerk.com](http://www.binder-feuerwerk.com)

### Veranstalter:

Department Frauenheilkunde Innsbruck  
Direktor: Univ.-Prof Dr. Christian Marth

### Organisation:

Univ.-Prof. Mag. Dr. Andreas Widschwendter  
Ingrid Zeimet-Kirchmair  
Univ.-Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe Innsbruck  
Anichstraße 35, 6020 Innsbruck  
Tel.: (+43/512) 504 23051, Fax: (+43/512) 504 23055  
E-mail: [ingrid.kirchmair@tirol-kliniken.at](mailto:ingrid.kirchmair@tirol-kliniken.at)

### Teilnahmegebühren:

Fachärztinnen/Fachärzte: 90,- Euro  
Ärzte in Ausbildung: 30,- Euro

### Anmeldung:

mit beiliegendem Formular bis spätestens **10. Mai 2017**



Um die Approbation im Rahmen des Diplom-Fortbildungsprogrammes der ÖÄK wird angefragt.

[www.frauenklinik.at](http://www.frauenklinik.at)

# Sommerfortbildungsprogramm 2017

08.50 Uhr **Begrüßung/Eröffnung**  
Andrea Waitz-Penz, Christian Marth

## Onkologie/Osteoporose

9.00 – 10.50 Uhr

Vorsitz: Christian Marth, Andrea Waitz-Penz

09.00 Uhr **Onkologische Nachsorge in der gynäkologischen Praxis**  
Alain Zeimet, Daniel Reimer  
Univ.-Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Innsbruck

09.20 Uhr **Update gynäkologische Onkologie für die Praxis**  
Christian Marth  
Univ.-Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Innsbruck

09.40 – 10.00 Uhr **Kaffeepause**

10.00 Uhr **Update Senologie für die Praxis**  
Daniel Egle  
Univ.-Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Innsbruck

10.20 Uhr **Osteoporose - Update**  
Claudia Götsch  
Endokrinologie und Osteoporose, Innsbruck

10.50 – 12.30 Uhr **Mittagessen**

## Geburtshilfe

12.30 – 14.30 Uhr

Vorsitz: Astrid Berger, Karl Heinz Kraxner

12.30 Uhr **ThromboASS und Lovenox in der Schwangerschaft: Wann? Wer? Daten und Empfehlungen**  
Ludwig Wildt  
Univ.-Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Innsbruck

12.45 Uhr **Oligohydramnion: Was muss ich abklären?**  
Gabi Gufler  
Univ.-Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Innsbruck

[www.frauenklinik.at](http://www.frauenklinik.at)

# Sommerfortbildungsprogramm 2017

- 13.00 Uhr **Polyhydramnion: Was muss ich abklären?**  
Helene Schaffenrath  
Univ.-Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Innsbruck
- 13.15 Uhr **Update Präeklampsie und Konsensusempfehlungen zum klinischen Einsatz des Präeklampsietests**  
Astrid Berger  
Univ.-Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Innsbruck
- 13.35 – 13.55 Uhr *Kaffeepause*
- 13.55 Uhr **Frühe Hilfen in Tirol**  
Sandra Aufhammer  
kontakt+co Jugendrotkreuz, Innsbruck
- 14.15 Uhr **Uterustorsion in der Schwangerschaft (Fallbericht)**  
Magdalena Ritter  
Univ.-Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Innsbruck

## Endokrinologie

14.30 – 15.45 Uhr

Vorsitz: Bettina Toth, Andrea Waitz-Penz

- 14.30 Uhr **IVF/ICSI im natürlichen Zyklus**  
Bettina Toth  
Univ.-Klinik für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin, Innsbruck
- 14.45 Uhr **Notfallkontrazeption - Update**  
Katharina Feil  
Univ.-Klinik für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin, Innsbruck
- 15.00 Uhr **Hyperprolaktinämie**  
Sarah Feigl  
Univ.-Klinik für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin, Innsbruck

[www.frauenklinik.at](http://www.frauenklinik.at)

# Sponsoren

## Platinsponsor

The logo for TEVA, consisting of the word "TEVA" in a stylized, outlined font.The logo for ratiopharm, featuring the word "ratiopharm" in a bold, lowercase sans-serif font, with two horizontal orange lines above and below the text.

## Sponsoren

The logo for AMGEN, with the word "AMGEN" in a bold, blue, sans-serif font.The logo for ANGELINI, featuring a stylized blue triangle above the word "ANGELINI" in a blue, sans-serif font.The logo for astellas, with a red and grey star icon to the left of the word "astellas" in a lowercase sans-serif font, and the tagline "Leading Light for Life" below it.The logo for AstraZeneca, with the word "AstraZeneca" in a purple and blue font, followed by a yellow DNA helix icon.The logo for Celgene, featuring a stylized blue and white circular icon to the left of the word "Celgene" in a blue, sans-serif font.The logo for Eisai, with the word "Eisai" in a bold, black, sans-serif font inside a pink and blue oval.The logo for FERRING PHARMACEUTICALS, with the word "FERRING" in a bold, blue, sans-serif font inside a white box with a blue border, and "PHARMACEUTICALS" in a smaller font below it.The logo for FRESENIUS KABI, featuring a stylized blue icon of three vertical lines to the left of the words "FRESENIUS" and "KABI" in a blue, sans-serif font.

GE Healthcare

The logo for Montavit, with a stylized orange and blue icon above the word "Montavit" in a blue, sans-serif font.The logo for NOVARTIS, featuring a stylized orange and blue icon to the left of the word "NOVARTIS" in a blue, sans-serif font.The logo for PELPHARMA, with a red circle containing a white "P" to the left of the word "PELPHARMA" in a bold, red, sans-serif font, and the tagline "Ein österreichisches Pharmaunternehmen" below it.The logo for Pfizer, with the word "Pfizer" in a white, cursive font inside a blue oval.The logo for Pierre Fabre, featuring a stylized blue icon above the words "Pierre Fabre" in a blue, sans-serif font.The logo for Roche, with the word "Roche" in a bold, blue, sans-serif font inside a blue hexagon.

Stand bei Drucklegung

[www.frauenklinik.at](http://www.frauenklinik.at)

## Fachkurzinformation zu Umschlagseite 2

### **Abraxane 5 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Infusionssuspension. Qualitative und quantitative Zusammensetzung:**

Jede Durchstechflasche enthält 100 mg Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel-Formulierung. Jede Durchstechflasche enthält 250 mg Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel-Formulierung. Nach der Rekonstitution enthält jeder ml der Suspension 5 mg Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel-Formulierung. **Liste der sonstigen Bestandteile:**

Jeder ml des Konzentrats enthält 0,183 mmol Natrium bzw. 4,2 mg Natrium, Albuminlösung vom Menschen (enthält Natrium,

Natriumcaprylat und N-Acetyltryptophan). **Anwendungsgebiete:** Abraxane-Monotherapie ist indiziert für die Behandlung des

metastasierten Mammakarzinoms bei erwachsenen Patienten, bei denen die Erstlinientherapie der metastasierten Erkrankung

fehlgeschlagen ist und für die eine standardmäßige Anthracyclin-enthaltende Therapie nicht angezeigt ist. Abraxane ist in

Kombination mit Gemcitabin indiziert für die Erstlinienbehandlung von erwachsenen Patienten mit metastasiertem Adenokarzi-

nom des Pankreas. Abraxane ist in Kombination mit Carboplatin indiziert für die Erstlinienbehandlung des nicht-kleinzelligen

Bronchialkarzinoms bei erwachsenen Patienten, bei denen keine potentiell kurative Operation und/oder Strahlentherapie möglich

ist. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. Stillen. Patienten mit

einem Ausgangswert der Neutrophilenzahl von  $<1.500$  Zellen/ $\text{mm}^3$ . **Inhaber der Zulassung:** Celgene Europe Limited, 1 Long-

walk Road, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1DB, Vereinigtes Königreich. **Verschreibungspflicht/Apothekenpflicht:** Rezept- und

apothekenpflichtig. **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Antineoplastische Mittel, pflanzliche Alkaloide und andere natürliche

Mittel, Taxane. **ATC-Code:** L01CD01. **Angaben zu besonderen Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die**

**Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln oder sonstigen Wechselwirkungen, zu Fertilität, Schwanger-**

**schaft und Stillzeit sowie Nebenwirkungen sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen. Stand der Infor-**

**mation:** Juli 2015.

# Was ein Tag ausmacht\*

**LONQUEX**  
lipegfilgrastim

JEDER TAG ZÄHLT.<sup>1-8</sup>

\* Lonquex ist für die Reduzierung der Dauer einer Neutropenie bei erwachsenen Patienten indiziert, die eine zytotoxische Chemotherapie gegen bestimmte bösartige Erkrankungen erhalten (ausgenommen chronisch-myeloische Leukämie und myelodysplastische Syndrome).

**Literatur:** 1. Pettengell R, et al. Support Care Cancer 2008;16:1299-309. 2. daCosta DiBonaventura M, et al. Am Health Drug Benefits 2014;7:386-96. 3. Teuffel O, et al. Support Care Cancer 2012;20:2755-64. 4. Fortner BV, et al. J Support Oncol 2006;4:472-8. 5. Fortner BV, et al. Support Cancer Ther 2006;3:173-7. 6. Meza L, et al. Proc Am Soc Clin Oncol 2002;21: Abstract 2640. 7. Crawford J. Chapter 9. Aus: Cancer and Drug Discovery Development. Supportive Care in Cancer Therapy DOI: 10.1007/978-1-59745-291-5\_9, Hrsg.: D.S. Ettinger ©Humana Press, Totowa, NJ. 8. Li Y, et al. Blood. 2014;124: Abstract 4960

Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu melden. Hinweise zur Meldung von Nebenwirkungen, siehe Abschnitt 4.8 der Fachinformation.

#### Lonquex 6 mg Injektionslösung

**Qualitative und Quantitative Zusammensetzung:** Jede Fertigspritze enthält 6 mg Lipegfilgrastim\* in 0,6 ml Lösung. Ein ml Injektionslösung enthält 10 mg Lipegfilgrastim. Der Wirkstoff ist ein kovalentes Konjugat von Filgrastim\*\* mit Methoxypolyethylenglycol (PEG) über einen Kohlenhydrat-Linker. \*Beruht nur auf dem Proteingehalt. Die Konzentration beträgt 20,9 mg/ml (d. h. 12,6 mg je Fertigspritze), wenn der PEG-Anteil und der Kohlenhydrat-Linker eingerechnet sind. \*\*Filgrastim (rekombinanter methionilylierter humaner Granulozyten koloniestimulierender Faktor [G-CSF]) wird mittels rekombinanter DNA-Technologie aus Zellen von *Escherichia coli* hergestellt. Die Stärke dieses Arzneimittel soll nicht mit der Stärke anderer pegylierter oder nicht-pegylierter Proteine der gleichen therapeutischen Klasse verglichen werden. Weitere Informationen siehe Abschnitt 5.1 der Fachinformation. Sonstige Bestandteile mit bekannter Wirkung: Jede Fertigspritze enthält 30 mg Sorbitol. Jede Fertigspritze enthält weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium. **Anwendungsgebiete:** Zur Verkürzung der Dauer von Neutropenien und zur Verminderung der Inzidenz von febriler Neutropenie bei erwachsenen Patienten, die wegen einer malignen Erkrankung eine zytotoxische Chemotherapie erhalten (mit Ausnahme von chronisch myeloischer Leukämie und myelodysplastischen Syndromen). **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der genannten sonstigen Bestandteile. **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Immunstimulanzien, koloniestimulierende Faktoren, ATC-Code: L03AA14. **Sonstige Bestandteile:** Essigsäure 99 %; Natriumhydroxid (zur pH-Anpassung); Sorbitol (E 420); Polysorbat 20; Wasser für Injektionszwecke. **Art und Inhalt des Behältnisses:** 0,6 ml Lösung in einer Fertigspritze (Typ-I-Glas) mit einem Kolbenstopfen [Poly(ethylen co tetrafluorethylen) beschichteter Brombutylkautschuk] und einer fixierten Injektionsnadel (Edelstahl; 29 G [0,34 mm] oder 27 G [0,4 mm] x 0,5 Zoll [12,7 mm]). Packungsgrößen: Packungen mit 1 Fertigspritze mit oder ohne Schutzvorrichtung (verhindert Nadelstichverletzungen und mehrmaligen Gebrauch). Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht. **Inhaber der Zulassung:** UAB "Sicor Biotech", Molėtų pl. 5, LT-08409 Vilnius, Litauen. **Verschreibungspflicht/Apothekenpflicht:** Rezept- und apothekenpflichtig, wiederholte Abgabe verboten. **Stand der Information:** 06/2015.

Bitte senden Sie dieses Formular **bis spätestens 10. Mai 2017** an:

**Telefax: (+43/512) 504 23055**

z.H. Fr. Ingrid Zeimet-Kirchmair  
Univ.-Klinik für Frauenheilkunde Innsbruck  
Anichstraße 35, 6020 Innsbruck  
ingrid.kirchmair@tirol-kliniken.at

## ANMELDUNG

### **Sommerfortbildungsprogramm 2017 der Universitätsklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Innsbruck**

**20. Mai 2017, FeuerWerk – HolzErlebnisWelt – Fügen**

**Teilnahmegebühr Seminar:** Fachärzte: € 90,-  
Ärzte in Ausbildung: € 30,-

Titel: ..... ÖÄK-Nr.: .....

Vorname: .....

Nachname: .....

Anschrift: .....

Tel.: ..... E-mail: .....

**Ich nehme am Seminar inkl. Mittagessen teil.**

Fachärzte € 90,-; Ärzte in Ausbildung € 30,-; Einzahlung bis spätestens 15. Mai 2017  
Medizinische Universität Innsbruck; Konto-Nr.: 100415593; BLZ: 16000,  
IBAN: AT07 1600 0001 0041 5593, BIC: BTVAAT22  
Projekt-Nr.: D-152-910-011-036 „Gynäkologische Fortbildung“  
(Bitte unbedingt die Projektnummer bei der Überweisung angeben)

**Begleitperson**

*Wir bitten Sie, die Kosten für die Begleitperson (Mittagessen) direkt im  
Veranstaltungszentrum zu bezahlen.*

Datum: .....

Unterschrift: .....

# Anfahrtsplan

FeuerWerk – HolzErlebnisWelt  
Zillertalstraße 39, 6263 Fügen



[www.binder-feuerwerk.at/feuerwerk/  
lage-erreichbarkeit.html](http://www.binder-feuerwerk.at/feuerwerk/lage-erreichbarkeit.html)